

αυτό σας προκαλεί δύσπνοια, οπότε θα πρέπει να καθίσετε. Ζητήστε σε κάποιον να μείνει μαζί σας μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο σε περίπτωση που δεν αισθανθείτε καλά πάλι.

Αναίσθητοι ασθενείς θα πρέπει να τοποθετούνται στο πλάι σε θέση ανάνηψης.

Δώστε τη χρησιμοποιημένη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapren στο νοσοκομείο ή στον φαρμακοποιό για κατάλληλη απορρίψη.

#### Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση ANAPEN Junior από την κανονική

- Εάν έχετε κάνει ένεση μεγαλύτερης δόσης αδρεναλίνης ή έχετε κάνει την ένεση σε κάποιο αγγείο ή στο δάχτυλό σας, πρέπει να αναζητήσετε άμεσα ιατρική παρακολούθηση στο πλησιέστερο νοσοκομείο.
- Εάν έχετε αμφιβολίες για τη χρήση αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

#### 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όπως όλα τα φάρμακα έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

- Το Anapren Junior περιέχει μεταδιθειώδες νάτριο (E223), το οποίο μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις αλλεργικού τύπου και δυσκολία στην αναπνοή, ειδικά στα άτομα εκείνα που έχουν ιστορικό άσθματος. Θα πρέπει να αναζητήσετε άμεσα ιατρική παρακολούθηση εάν αντιμετωπίσετε τα συμπτώματα αυτά.
- Συνήθισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες της αδρεναλίνης περιλαμβάνουν αίσθημα καρδιακών παλμών (αρρυθμίες), γρήγορο ή ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό, εφίδρωση, ναυτία, έμετο, δυσκολία στην αναπνοή, ζάλη, αδυναμία, ωχρότητα (χλωμάδα), τρόμο, κεφαλαλγία, σύγχυση, νευρικότητα, ανησυχία και ψυχρότητα των άκρων.
- Λιγότερο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνουν ψευδαισθήσεις, λιποθυμία, μυδρίαση (διεσταλμένες κόρες των ματιών), δυσκολία στην ούρηση, μυϊκός τρόμος, αυξημένη αρτηριακή πίεση, μεταβολές στο αίμα όπως υψηλά επίπεδα σακχάρου, χαμηλά επίπεδα καλίου και υψηλό περιεχόμενο οξέων.
- Περισσότερες σε υψηλότερες δόσεις ή σε εσθιασθέντα άτομα εμφανίζονται αιφνίδια άνοδος της αρτηριακής πίεσης που μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλική αιμορραγία, ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός και καρδιακή ανακοπή, καθώς επίσης μπορεί να εμφανιστεί μειωμένη ροή του αίματος στο δέρμα, βλεννογόνο ιστούς και νεφρά.

**Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών (ΕΟΦ)** Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Για την Ελλάδα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: 21320.40.380/337, Fax:2106549585, www.eof.gr). Για την Κύπρο, στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, www.moh.phs.gov.cy/phs, Fax 357 22608649. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

#### 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ANAPEN JUNIOR

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί και στην αυτοχορηγούμενη ένεση. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναγράφεται εκεί.

Να μην φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 25°C.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο εάν παρατηρήσετε ότι το διάλυμα είναι θολό, χρωματισμένο ή περιέχει σωματίδια. Βλέπε «Οδηγίες χρήσης» για οδηγίες ελέγχου αυτού του φαρμάκου. Φυλάξτε την αυτοχορηγούμενη ένεση στο εξωτερικό κουτί για να προστατευτεί από το φως. Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

#### 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

##### Τι περιέχει το ANAPEN Junior

- Η δραστική ουσία είναι αδρεναλίνη (επινεφρίνη) 150 μικρογραμμάρια σε 0,3 ml.
- Άλλα συστατικά είναι: μεταδιθειώδες νάτριο (E223), χλωριούχο νάτριο, υδροχλωρικό οξύ, ενέσιμο ύδωρ.

##### Εμφάνιση του ANAPEN Junior και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το Anapren Junior αποτελείται από μια προγεμισμένη σύριγγα με ενέσιμο διάλυμα αδρεναλίνης που περιέχεται σε μια συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης. Παράγεται σε δύο περιεκτικότητες. ANAPEN 300 μικρογραμμάρια σε 0,3ml ενέσιμο διάλυμα και Anapren Junior 150 μικρογραμμάρια σε 0,3ml ενέσιμο διάλυμα. Οι συσκευασίες του ANAPEN περιέχουν 1 ή 2 αυτοχορηγούμενες ενέσεις με μια θερμοδιαμορφωμένη θήκη προστασίας μέσα στο κουτί. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. Το εκτεθειμένο μήκος της βελόνας είναι: 10 χλστ. ± 1.5 χλστ.

**Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:** LINCOLN MEDICAL LTD, UNIT B STANLEY COURT, GLENMORE BUSINESS PARK, TELFORD ROAD, SALISBURY, SP2 7GH, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.

**Υπεύθυνος κυκλοφορίας για την Ελλάδα:** ALLERTEC HELLAS A.E., Κ. Καραμανλή 74, 55135 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 488 300

**Αντιπρόσωπος Κύπρου:** Γεώργιος Πέτρου Λτδ, Άρεως 50, 2234 Λατσία, Λευκωσία, Τηλ. 357 22757277

**Παραγωγός:** LYOFAL - SALON DE PROVENCE, ZA La Gandonne, 452 rue du Rémoulaire, SALON DE PROVENCE, 13300, Γαλλία.

**Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι εγκεκριμένο στα κράτη μέλη του ΕΟΧ με τις ακόλουθες ονομασίες:**

**Anapren Junior:** Αυστρία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισπανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Ολλανδία

**Anapren (Junior):** Νορβηγία

**Anapren:** Εσθονία, Φιλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ισπανία

**Chenpen:** Βέλγιο, Ιταλία

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης επικαιροποιήθηκε για τελευταία φορά 12/2019

Το ANAPEN είναι καταχωρημένο σήμα.

002567/03  
A2NL15E01

## ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

# Anapren Junior® 150 μικρογραμμάρια σε 0,3 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Αδρεναλίνη (Επινεφρίνη)

**Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.**

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνηθισμένη για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν εμφανίσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

#### Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1. Τι είναι το Anapren Junior και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Anapren Junior
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Anapren Junior
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Anapren Junior
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες



#### 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ANAPEN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

- Το Anapren Junior αποτελείται από μια προγεμισμένη σύριγγα που περιέχει αδρεναλίνη σε μια συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης. Αυτή η συσκευή χορηγεί αδρεναλίνη σε εφάπαξ δόση στο μ.
- Το φάρμακο αυτό είναι για **έκτακτες καταστάσεις μόνο** και θα πρέπει να αναζητήσετε ιατρική παρακολούθηση αμέσως μετά τη χρήση της αυτοχορηγούμενης ένεσης.
- Η αδρεναλίνη είναι μια φυσική ορμόνη που απελευθερώνεται ως απάντηση στην ένταση (στρες). Σε οξείες αλλεργικές αντιδράσεις βελτώνει την πίεση του αίματος, τη λειτουργία της καρδιάς και μειώνει το πρήξιμο. Η αδρεναλίνη είναι επίσης γνωστή ως επινεφρίνη.
- Το Anapren Junior χρησιμοποιείται ως θεραπευτικό διάλυμα σε σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις ή αναφυλαξία που προκαλούνται από φυσιολογικά ή άλλες τροφές, φάρμακα, δογκώματα ή τσιμπήματα εντόμων και άλλα αλλεργιογόνα καθώς και από αναφυλαξία άσκησης ή άλλη άγνωστη αιτία.

#### 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ANAPEN

##### Μη χρησιμοποιήσετε το ANAPEN Junior

Δεν υπάρχει κανένας γνωστός λόγος για να μη χρησιμοποιήσετε κανείς το Anapren Junior σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης.

##### Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στο γιατρό ή στο φαρμακοποιό σας πριν να χρησιμοποιήσετε το Anapren Junior

- Ο γιατρός σας, σας έχει δώσει προσεκτικές οδηγίες για το πότε να χρησιμοποιήσετε την αυτοχορηγούμενη ένεση ANAPEN Junior καθώς και το σωστό τρόπο για τη χρήση της.
- Θα πρέπει να αναφέρετε στο γιατρό σας, εάν υποφέρετε από καρδιοπάθεια, συμπεριλαμβανομένης της στηθάγχης, υπερθυρεοειδισμό, υψηλή αρτηριακή πίεση, ελαττωμένα επίπεδα καλίου και αυξημένα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα, διαταραχές της κυκλοφορίας του αίματος, φαιοχρωμοκύττωμα (ένα είδος όγκου των επινεφριδίων), υψηλή ενδοφθάλμια πίεση (γλαύκωμα), νεφρική νόσο, νόσο προστάτη, διαβήτη, ή κάποια άλλη ιατρική κατάσταση.
- Αν έχετε άσθμα μπορεί να βρίσκεστε σε αυξημένο κίνδυνο σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης.
- Όποιοι έχει εμφανίσει επεισόδιο αναφυλαξίας θα πρέπει να απευθυνθεί στο γιατρό του για έλεγχο των ορσών στις οποίες είναι αλλεργικός, ώστε να τις αποφύγει αυστηρά στο μέλλον. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η αλλεργία σε μια ουσία μπορεί να οδηγήσει σε αλλεργίες σε πολλές σχετικές ουσίες.
- Αν έχετε τροφικές αλλεργίες είναι σημαντικό να ελέγχετε τα συστατικά σε καθετί που καταπίνετε (συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων) καθώς ακόμη και μικρές ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές αντιδράσεις.
- Επαναλαμβανόμενη τοπική ένεση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο δέρμα στα σημεία της ένεσης. Ένεση από λάθος σε αγγείο μπορεί να προκαλέσει αιφνίδια άνοδο της αρτηριακής πίεσης. Ένεση από λάθος στα χέρια ή στα πόδια μπορεί να προκαλέσει απώλεια αιματικής ροής στις συγκεκριμένες περιοχές. Θα πρέπει να αναζητήσετε αμέσως ιατρική συμβουλή στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

##### Άλλα φάρμακα και το Anapren Junior

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα συμπεριλαμβανομένων:

- Φάρμακα για την καρδιοπάθεια όπως δακτυλίδια (διγοξίνη), β-αναστολείς, κινιδίνη
- Φάρμακα για την κατάθλιψη όπως τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (αΜΑΟ), σεροτονίνη και αναστολείς της επαναπρόσληψης της νοραδρεναλίνης (SNRIs)
- Φάρμακα για το διαβήτη, ο γιατρός σας μπορεί να αλλάξει τη δοσολογία τους μετά από τη χρήση ANAPEN
- Φάρμακα για τη νόσο του Πάρκινσον
- Φάρμακα για τη νόσο του θυρεοειδούς αδένος
- Άλλα φάρμακα: αντισταμινικά όπως φερισολαμίνη ή χλωροφαινοϋρίνη, θεοφυλλίνη, ιπροτροπίο και οξιτροπίο (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των αεροφόρων οδών συμπεριλαμβανόμενου του άσθματος), ακυτοκίνη (χρησιμοποιείται κατά τον τοκετό), εισπνεύσιμα αναισθητικά, α-αδρενεργικοί αναστολείς (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της

αβήλης αρτηριακής πίεσης), συμπαθομιμητικά (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του άσθματος, άλλων νόσων των αεροφόρων οδών και της ρινικής συμφόρησης).

### Το ANAPREN Junior με αλκοόλ

Το αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει τις ενέργειες του φαρμάκου αυτού αυξάνοντας τη δράση του.

### Κύηση και Θηλασμός

Εάν είσαθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσαθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.

- Δεν είναι σίγουρο εάν λαμβάνοντας αδρεναλίνη κατά τη διάρκεια της κύησης μπορεί να υπάρξει κίνδυνος για το αγέννητο μωρό σας. Αυτό δεν θα πρέπει να σας αποτρέψει αν είσατε έγκυος από το να χρησιμοποιήσετε το Anapren Junior σε επείγουσα κατάσταση, επειδή η ζωή σας μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο. Θα πρέπει να το συζητήσετε με το γιατρό σας, πριν δημιουργηθεί μία τέτοια επείγουσα κατάσταση.
- Η αδρεναλίνη δεν αναμένεται να έχει κάποια επίδραση στο βρέφος που θηλάζει.

### Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Δεν θα πρέπει να οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανήματα μετά τη χορήγηση αυτού του φαρμάκου, επειδή μπορεί να αντιμετωπίσετε ακόμη τα συμπτώματα του αναφυλακτικού σοκ.

### Το Anapren Junior περιέχει μεταδιθειώδες νάτριο (E223)

Το μεταδιθειώδες νάτριο μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις αλλεργικού τύπου και δυσκολία στην αναπνοή, ειδικά σε εκείνους που έχουν ιστορικό άσθματος.

Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν γνωρίζετε ότι έχετε αλλεργία στο μεταδιθειώδες νάτριο (E223).

### Το ANAPREN Junior περιέχει μικρή ποσότητα χλωριούχου νατρίου (αλάτι)

Αυτό το φάρμακο περιέχει λιγότερο από 1mmol νάτριο (23mg) ανά δόση δηλ. ουσιαστικά δεν περιέχει νάτριο.

### 3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ANAPREN JUNIOR

Πάντα να έχετε μαζί σας 2 συσκευές αυτοχορηγούμενης ένεσης σε περίπτωση που η πρώτη χορήγηση αποτύχει ή μια δόση δεν είναι αρκετή.

- Πάντοτε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.
- Εάν έχετε αμφιβολίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Να κάνετε την ένεση μόνο στο μύ του μπουρού.
- Για μια χρήση μόνο, παρακαλείστε να το απορρίψετε με ασφάλεια αμέσως μετά τη χρήση. Το Anapren Junior απελευθερώνει μια εφάπαξ δόση 0,3 ml υγρού που ισοδυναμεί με 0,15mg (150 μικρογραμμάρια) αδρεναλίνης. Μετά τη χρήση ένας όγκος 0,75ml θα παραμείνει στη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης αλλά δε μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.

Η αντίδραση ξεκινά συνήθως μέσα σε μερικά λεπτά από την έκθεσή σας στο αλλεργιογόνο και το άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει:

- Φαγούρα στο δέρμα, έντονο εξάνθημα κνίδωσης (εξάνθημα από τσουκνίδα), κοκκινίλα και πρήξιμο των ματιών, των χελιών ή της γλώσσας.
- Δυσκολία στην αναπνοή λόγω πρήξιμου στο λάρυγγα. Συριγμός, δύσπνοια και βήχας μπορεί να προκληθούν από τη σύσφιξη των μυών στους πνευμονές.
- Άλλα συμπτώματα αναφυλαξίας συμπεριλαμβανομένων κεφαλαλγίας, έμετου και διάρροιας.
- Κατάρρευση και απώλεια συνείδησης εξαιτίας της αιφνίδιας μείωσης της αρτηριακής πίεσης.

Αν εμφανίσετε αυτά τα σημεία και συμπτώματα χρησιμοποιήστε αμέσως την αυτοχορηγούμενη ένεση Anapren Junior. Πρέπει να ενέσετε αυτό το φάρμακο μόνο στο μυ στο εξωτερικό μέρος του μπουρού, όχι στο γλουτό. Ορισμένες φορές μια εφάπαξ δόση αδρεναλίνης μπορεί να μην είναι επαρκής για να αντιστραφούν πλήρως οι επιδράσεις μιας σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης. Για το λόγο αυτό, ο γιατρός σας είναι πιθανό να συνταγογραφήσει περισσότερα του ενός Anapren Junior για σας. Εάν δεν βελτιωθούν τα συμπτώματά σας ή επιδεινωθούν εντός 5-15 λεπτών μετά την πρώτη ένεση, είτε εσείς ή το άτομο που είναι μαζί σας πρέπει να χορηγήσει μια δεύτερη ένεση. Για τον λόγο αυτό πρέπει πάντοτε να έχετε μαζί σας περισσότερα του ενός Anapren Junior μαζί σας.

### Χρήση σε ενήλικες

- Η συνήθης δόση είναι 300 μικρογραμμάρια.
- Ενήλικες μεγαλύτερου βάρους μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από μια ενέσεις για να αναστρέψουν το αποτέλεσμα μιας αλλεργικής αντίδρασης.

### Χρήση σε παιδιά και εφήβους


- Η καταλληλή δόση μπορεί να είναι 150 μικρογραμμάρια ή 300 μικρογραμμάρια.
- Αυτό εξαρτάται από το βάρος σώματος του παιδιού και την κρίση του γιατρού.
- Παιδιά και έφηβοι βάρους άνω των 30 kg θα πρέπει να λαμβάνουν Anapren 300 μικρογραμμάρια.
- Μια συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης που χορηγεί 300 μικρογραμμάρια αδρεναλίνης είναι επίσης διαθέσιμη.
- Δοσολογία μικρότερη των 150 μικρογραμμάρων δεν μπορεί να χορηγηθεί με επαρκή ακρίβεια σε παιδιά που ζυγίζουν λιγότερο από 15 kg και η χρήση της δεν συνιστάται παρά μόνο εάν υπάρχει κατάσταση απειλητική για τη ζωή και υπό την επίβλεψη γιατρού.

### Οδηγίες χρήσης

**Συνιστάται τα μέλη της οικογενείας σας, οι υπεύθυνοι για τη φροντίδα σας ή οι δάσκαλοι να λάβουν επίσης οδηγίες για την ορθή χρήση του Anapren Junior.**

### A. Εξαρτήματα της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapren:

Πριν από τη χρήση της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapren, πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τα εξαρτήματα της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης. Αυτά εμφανίζονται στην εικόνα.



- **Περιστρεφόμενο κάλυμμα πάνω από τη θυρίδα διαλύματος:** Περιστρέψτε το κάλυμμα πάνω από τις θυρίδες του διαλύματος ώστε να ευθυγραμμιστούν οι φακοί με τις θυρίδες του διαλύματος στο σώμα της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης.
- **Θυρίδα διαλύματος:** Κοιτάξτε μέσα από το φακό σε αυτήν τη θυρίδα πριν από την ένεση για να ελέγξετε ότι το διάλυμα είναι διαυγές και έτοιμο για χρήση.
- **Δείκτης ένεσης:** Πριν από την ένεση, μπορείτε να δείτε ένα λευκό πλαστικό έμβολο διαμέσου της θυρίδας. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapren δεν έχει πυροδοτηθεί κατά λάθος ή δεν έχει παραβιαστεί. Μετά την ένεση, ο δείκτης ένεσης γίνεται κόκκινος. Αυτό υποδεικνύει τη σωστή πυροδότηση της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapren.
- **Μαύρο προστατευτικό κάλυμμα βελόνας (αναστρέψιμο):** Προστατεύει τη βελόνα όταν δε χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapren. Απομακρύνετε το προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας πριν από την ένεση. Μετά από την ένεση, περιστρέψτε το μαύρο προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας και επαναφέρετέ το στο ίδιο άκρο της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapren για να καλύψετε τη βελόνα.
- **Γκρι πάμα ασφαλείας:** Καλύπτει το κόκκινο κουμπι πυροδότησης. Εμποδίζει το ακούσιο πάτημα του κουμπιού.

**Μην αφαιρείτε το μαύρο προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας ούτε το γκρι πάμα ασφαλείας έως ότου χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης σας Anapren.**

### B. Ελέγξτε τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapren

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapren, πρέπει να την ελέγξετε ως εξής:

1. Περιστρέψτε το κάλυμμα πάνω από τις θυρίδες του διαλύματος, πλήρως αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού, όπως δείχνει το βέλος ώστε να ευθυγραμμιστούν οι φακοί με τις θυρίδες του διαλύματος στο σώμα της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης.
2. Κοιτάξτε μέσα από τους φακούς τη **θυρίδα διαλύματος**. Ελέγξτε ότι το διάλυμα είναι διαυγές και άχρωμο. Εάν είναι θολό, χρωματισμένο ή περιέχει σωματίδια, απορρίψτε τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapren.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο **δείκτης ένεσης** δεν είναι κόκκινος. Εάν είναι κόκκινος, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapren έχει ήδη πυροδοτηθεί και πρέπει να την απορρίψετε.
4. Περιστρέψτε το κάλυμμα πάνω από τις θυρίδες του διαλύματος πλήρως προς τα πίσω σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, όπως δείχνει το βέλος για να βεβαιωθείτε ότι είναι καλυμμένες και οι δύο θυρίδες διαλύματος. Τοποθετήστε τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapren πίσω στη χάρτινη συσκευασία έως ότου χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσετε.

### Γ. Χρήση της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapren

Εάν το μαύρο προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας έχει αφαιρεθεί, **μην τοποθετείτε τον αντίχειρα, τα δάκτυλα ή το χέρι σας πάνω από το ανοικτό άκρο (άκρο βελόνας) της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapren.**

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapren, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε το μαύρο προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας τραβώντας δυνατά προς την κατεύθυνση του βέλους. Έτσι αφαιρείται επίσης ένα γκριζό προστατευτικό θηκάρι της βελόνας.
2. Αφαιρέστε το γκρι πάμα ασφαλείας από το κόκκινο κουμπι πυροδότησης, τραβώντας όπως **υποδεικνύουν τα βέλη**.
3. Κρατήστε το ανοικτό άκρο (άκρο βελόνας) της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapren πάνω στην εξωτερική πλευρά του μπουρού. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapren πάνω από ελαφρύ ρουχισμό, όπως ρούχα από ντένιμ, βαμβάκι ή πολυεστέρα.
4. Πατήστε το κόκκινο κουμπι πυροδότησης έτσι ώστε να κάνει ένα κλικ. **Συνεχίστε να κρατάτε τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapren πάνω στην εξωτερική πλευρά του μπουρού για 10 δευτερόλεπτα.** Αφαιρέστε αργά τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapren από το μπουρό. Στη συνέχεια μαλάξτε απαλά την περιοχή ένεσης.
5. **Ο δείκτης ένεσης θα γίνει κόκκινος.** Αυτό σημαίνει ότι η ένεση ολοκληρώθηκε. Εάν ο δείκτης ένεσης δεν γίνει κόκκινος, η ένεση πρέπει να επαναληφθεί με καινούρια συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapren.
6. Μετά την ένεση, η βελόνα εξέρχεται. Για να την καλύψετε, εφαρμόστε το φαρδύ άκρο του μαύρου προστατευτικού καλύμματος της βελόνας πίσω στο ανοικτό άκρο (άκρο βελόνας) της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapren (όπως υποδεικνύει το βέλος).

Το Anapren Junior είναι σχεδιασμένο για θεραπευτική διάσωσης. Θα πρέπει πάντα να αναζητάτε ιατρική βοήθεια αμέσως μετά τη χρήση του Anapren Junior. Καλέστε 166 και ζητήστε ασθενοφόρο αναφέροντας «αναφυλαξία» **ακόμη και αν τα συμπτώματα δείχνουν ότι βελτιώνονται.** Στην Κύπρο καλέστε 199. Θα χρειαστεί να πάτε σε νοσοκομείο για παρακολούθηση και την επιπλέον θεραπεία που απαιτείται. Αυτό γίνεται διότι η αντίδραση μπορεί να ξανασυμβεί λίγο αργότερα. Ενώ περιμένετε ασθενοφόρο θα πρέπει να ξαπλώσετε κάτω με τα πόδια σηκωμένα εκτός αν