

Anapen®300 μικρογραμάρια σε 0,3 ml

ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένη σύριγγα

Αδρεναλίνη (Επινεφρίνη)

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγών χρήσης. Ισως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χρηγογόνης αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.

- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στη συνταγή.



Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγών:

1. Τι είναι το Anapen και ποια είναι η χρήση του

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Anapen

3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Anapen

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5. Πώς να φυλάσσεται το Anapen

6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ANAPEN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

• Το Anapen αποτελείται από μια προγεμισμένη σύριγγα που περιέχει αδρεναλίνη σε μια συσκευή αυτοχρογογόνης ενέσης. Αυτή η συσκευή χορηγεί αδρεναλίνη σε εφάπαξ δόση στο μυ.

• Το φάρμακο αυτό είναι για έκτακτες καταστάσεις μόνο και θα πρέπει να αναζητήσετε ιατρική παρακολούθηση μέσως μετά τη χορήγηση της αυτοχρογογόνης ενέσης.

• Η αδρεναλίνη είναι μια φυσική ορμόνη που απελευθερώνεται ως απάντηση στην ένταση (στρες). Σε οξείες αλλεργικές αντιδράσεις βελτιώνει την πίεση του αίματος, τη λειτουργία της καρδιάς και την αναπνοή και μειώνει το πρήγμα. Η αδρεναλίνη είναι επίσης γνωστή ως επινεφρίνη.

• Το Anapen χρησιμοποιείται ως θεραπεία διάσωσης σε σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις ή αναφυλαξίδι που προκαλούνται από φυστικά ή άλλες τροφές, φάρμακα, δαγκώματα ή τσιμπήματα εντόμων και άλλα αλλεργιογόνα καθώς και από αναφυλαξία άσκησης ή άλλη άγνωστη αιτία.

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ANAPEN

Μη χρησιμοποιήστε το ANAPEN

Δεν υπάρχει κανένας γνωστός λόγος για να μη χρησιμοποιήσει κανένας το Anapen σε επειγόντα αλλεργική αντίδραση.

Προειδοποίησης και Προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στο γιατρό ή στο φαρμακοποιό σας πριν να χρησιμοποιήσετε το Anapen.

• Ο γιατρός σας, σας έχει δώσει προσεκτικές οδηγίες για το πότε να χρησιμοποιήσετε την αυτοχρογογόνη ενέση ANAPEN καθώς και το σωστό τρόπο για τη χρήση της.

• Θα πρέπει να αναφέρετε στο γιατρό σας, εάν υποφέρετε από καρδιοπάθεια συμπεριλαμβανομένης της σπηλαγχής, υπερθυρεοειδισμό, υψηλή αρτηριακή πίεση, ελαπτωμένα επίπεδα καλού και αυξημένα επίπεδα αεβοτίσιο στο αίμα, διαταραχές της κυκλοφορίας του αίματος, φαιροχρωμοκύτταρα [ένα είδος όγκου των επινεφρίδων], υψηλή ενδοφθαλμική πίεση (γλαύκωμα), νεφρική νόσο, νόσο του προστάτη, διαβήτη, ή κάποια άλλη ιατρική κατάσταση.

• Αν έχετε άσθμα μπορεί να βρίσκεστε σε αυξημένο κίνδυνο σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης.

• Όποιος έχει εμφανίσει επεισόδιο αναφυλαξίας θα πρέπει να απευθυνθεί στο γιατρό του για έλεγχο των ουσιών στις οποίες είναι αλλεργικός, ώστε να τις αποφεύγει αυστηρά στο μέλλον. Είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι η αλλεργία σε μια ουσία μπορεί να οδηγήσει σε αλλεργίες σε πολλές στικές ουσίες.

• Αν έχετε τροφίκες αλλεργίες είναι σημαντικό να ελέγχετε τα συστατικά σε καθετή που καταπίνετε (συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων) καθώς ακόμη και μικρές ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές αντιδράσεις.

• Επαναλαμβανόμενη τοπική ενέση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο δέρμα στα σημεία της ενέσης. Ένεση από άλλος σε αγγείο μπορεί να προκαλέσει αιφνίδια άνοδο της αρτηριακής πίεσης. Ένεση από άλλος στα χέρια ή στα πόδια μπορεί να προκαλέσει απώλεια οιματικής ροής στις συγκεκριμένες περιοχές. Θα πρέπει να αναζητήσετε αμέσως ιατρική συμβουλή στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Άλλα φάρμακα και το Anapen

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα συμπεριλαμβανομένων:

• Φάρμακα για την καρδιοπάθεια όπως δακτυλίδια (διγοξίνη), β-αναστολείς, κινιδίνη

• Φάρμακα για την κατάθλιψη όπως τρικυλικά αντικαταθλιπτικά, αναστολείς της μονοαμινοσειδίστας (αΜΑΟ), σεροτονίνη και αναστολείς της επαναπρόσληψης της νοραδρεναλίνης (SNRIs)

• Φάρμακα για το διαβήτη, ο γιατρός σας μπορεί να αλλάξει τη δοσολογία τους μετά από τη χρήση ANAPEN

• Φάρμακα για τη νόσο του Πάρκινσον

• Φάρμακα για τη νόσο του θυρεοειδή αδένα

• Άλλα φάρμακα: αντιπαταρίνικά όπως διφανινδραμίνη ή χλωροφαινυραμίνη, θεοφυλλίνη, ιπρατρόπιο και οξιτρόπιο (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των αεροφόρων οδών συμπεριλαμβανομένου του οιματικούς, ακωτοκίνη (χρησιμοποιείται κατά τον τοκετό),

Ενώ περιμένετε το ασθενοφόρο θα πρέπει να ξαπλώσετε κάτω με τα πόδια σηκωμένα εκτός αν αυτό σας προκαλεί δύσπνοια, οπούτε θα πρέπει να καθίστε. Ζητήστε σε κάποιον να μείνει μαζί σας μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο σε περίπτωση που δεν αισθανθεί καλά πάλι.

Ανασήθητοι ασθενείς θα πρέπει να τοποθετούνται πλάγια σε θέση ανάπηψης.

Δώστε τη χρησιμοποιημένη συσκευή αυτοχρογογόνης ένεσης Anapen στο νοσοκομείο ή στο φαρμακοποιό για κατάλληλη απόρριψη.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση ANAPEN από την κανονική

- Εάν έχετε κάνει ένεση μεγαλύτερης δόσης αδρεναλίνης ή έχετε κάνει την ένεση σε κάποιο αγγείο ή στο δάχτυλό σας, πρέπει να αναζητήσετε αμέσως ιατρική παρακολούθηση στο πλησιέστερο νοσοκομείο.
- Εάν έχετε αμφιβολίες για τη χρήση αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Όποιας όλα τα φάρμακα έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

• Το ANAPEN περιέχει μεταδιθιεώδες νάτριο (E223), το οποίο μπορεί να προκαλέσει ανιδράσεις σε ολέργοντα και δυσκολία στην αναπνοή, ειδικά στα άτομα εκείνα που έχουν ιστορικό άσθματος. Θα πρέπει να αναζητήσετε αμέσως ιατρική παρακολούθηση εάν αντιμετωπίζετε τα συμπτώματα αυτά.

• Συνηθίσμενες ανεπιθύμητες ενέργειες της αδρεναλίνης περιλαμβάνουν αισθητικά πόνο, δυσκολία στην αναπνοή, ζάλη, αδυναμία, ωρχότητα (χλαμάδα), τρόμο, κεφαλαλγία, σύνχυση, νευρικότητα, ανησυχία και ψυχορρήτη των άκρων.

• Λιγότερο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερεί περιλαμβάνουν ψευδαίσθηση, λιποθυμία, μυδρίσιση (διεσταλμένες κόρες των ματιών), δυσκολία στην ούρηση, μυϊκός τρόμος, αυξημένη αρτηριακή πίεση, μεταβολές στο αίμα όπως ασθματικό σακχάρος, χαμηλή επιπέδα καλού και υψηλό περιεχόμενο οξεών.

• Περιστασιακά σε υψηλότερες δόσεις ή σε ευαίσθητα άτομα εμφανίζονται αιφνίδια άνοδος, της αρτηριακής πίεσης που μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλική αιμορραγία, ακανονιστικός καρδιακός ρυθμός και καρδιακή ανακοπή, καθώς επισής μπορεί να εμφανιστεί μειωμένη ροή του αιματού στο δέρμα, βλεννογόνους ιστούς και νεφρά.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενέργειών της συσκευασίας Εάν παρατηρήστε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, αποτελείται από μια προγεμισμένη σύριγγα που περιέχει αδρεναλίνη σε εφάπαξ δόση στο μυ. Εάν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγών χρήσης, πρέπει να αναζητήσετε αμέσως ιατρική παρακολούθηση.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενέργειών της συσκευασίας Εάν παρατηρήστε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, αποτελείται από μια προγεμισμένη σύριγγα που περιέχει αδρεναλίνη σε εφάπαξ δόση στο μυ. Εάν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγών χρήσης, πρέπει να αναζητήσετε αμέσως ιατρική παρακολούθηση.

5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ANAPEN Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φέρουν τα παιδιά. Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί και στην αυτοχρογογόνη ενέση. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναγράφεται εκεί.

Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 25°C.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο εάν παρείπετε ότι το διάλυμα είναι θολό, χρωματισμένο ή περιέχει σωματίδια. Βλέπε «Οδηγίες χρήσης» για οδηγίες ελέγχου αυτού του φαρμάκου.

Φυλάσστε την αυτοχρογογόνη ενέση στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως. Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της οποίες επειδέντες ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν έχετε χρησιμεύσει πάντα. Αυτά τα φάρμακα που δεν έχετε χρησιμεύσει πάντα πρέπει να πετάξετε στα σκουπίδια ή στα σκουπίδια της θεραπείας σας.

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι περιέχει το ANAPEN Το παρόν φύλλο οδηγών χρήσης για την Ελλάδα: ALLERTEC HELLAS A.E., K. Καραμανλή 74, 55135 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 488 300 Αντιπρόσωπος Κύπρου: Γεώργιος Πέτρου Λτδ, Αρεως 50, 2234 Λατσιά, Λευκωσία, Τηλ. 357 2275727 Παραγαγός: LYOFAL - SALON DE PROVENCE, ZA La Gandonne, 452 rue du Rémoulaire, SALON DE PROVENCE, 13300, Γαλλία.

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι εγκεκριμένο στα κράτη μέλη του ΕΟΧ με τις ακόλουθες ονομασίες:

Anapen: Ανατρία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ολλανδία

Chrenep: Βέλγιο, Ιταλία

Το παρόν φύλλο οδηγών χρήσης επικαιροποιήθηκε για τελευταία φορά 12/2019

Το ANAPEN είναι καταχωρισμένο σήμα.

ειπονέδημα αναισθητικά, α-αδρενεργικοί αναστολές (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης), συμπαθομητικά (χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του άσθματος, άλλων νόσων των αεροφόρων οδών και της ρινικής συμφόρησης).

To ANAPEN με αλκοόλ

Το αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει τις ενέργειες του φαρμάκου αυτού αυξάνοντας τη δράση του.

Κύηση και Θλασμός

Εάν είσθιε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθιε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβούλη του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.

- Δεν είναι σιγουρό εάν λαμβάνοντας αδρεναλίνη κατά τη διάρκεια της κύησης μπορεί να υπάρξει κίνδυνος για το αγέννητο μωρό σας. Αυτό δεν θα πρέπει να σας αποτρέψει αν είστε έγκυος από το να χρησιμοποιήσετε το ANAPEN σε επείγουσα κατάσταση, επειδή η ζωή σας μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο. Θα πρέπει να το συζητήσετε με το γιατρό σας, πριν δημιουργηθεί μια τέτοια επείγουσα κατάσταση.
- Η αδρεναλίνη δεν αναμένεται να έχει κάποια επίδραση στο βρέφος που θηλάζει.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Δεν θα πρέπει να οδηγήσετε ή να χειρίζεστε μηχανήματα μετά τη χορήγηση αυτού του φαρμάκου, επειδή μπορεί να αντιμετωπίζετε ακόμη τα συμπτώματα του αναφυλακτικού σοκ.

To ANAPEN περιέχει μεταδιθειώδες νάτριο (E223)

Το μεταδιθειώδες νάτριο μπορεί να προκαλέσει αντιρράσεις αλλεργικού τύπου και δυσκολία στην αναπνοή, ειδικά σε εκείνους που έχουν ιστορικό άσθματος.

Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας εάν γνωρίζετε ότι έχετε αλλεργία στο μεταδιθειώδες νάτριο (E223).

To ANAPEN περιέχει μικρή ποσότητα χλωριούχου νατρίου (αλάτι)

Αυτό το φάρμακο περιέχει λιγότερο από 1mmol νάτριο (23mg) ανά δόση δηλ. ουσιαστικά δεν περιέχει νάτριο.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ANAPEN

Πάντα να έχετε μαζί σας 2 συσκευές αυτοχορηγούμενης ένεσης σε περίπτωση που η πρώτη χορήγηση αποτούχει ή μια δόση δεν είναι αρκετή.

- Πάντοτε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας.
- Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η κάνετε την ένεση μόνο στο μυ του μηρού.
- Για μια χρήση μόνο, παρακαλείστε να το απορρίψετε με ασφάλεια αμέσως μετά τη χρήση. Το Anapen απελευθερώνει μια εφάπαξ δόση 0,3 ml υγρού που ιστοδυναμεί με 0,3mg (300 μικρογραμμάρια) αδρεναλίνη. Μετά τη χρήση ένας όγκος 0,75ml θα παραμείνει στη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης αλλά δε μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.

Η αντίδραση ξεκινά συνήθως μέσα σε μερικά λεπτά από την έκθεσή σας στο αλλεργιογόνο και το άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει:

- Φαγούρα στο δέρμα, έντονο εξάνθημα κνίδωσης (εξάνθημα από τουσουκίδα), κοκκινίλα και πρήξιμο των ματιών, των κειλίων ή της γλώσσας.
- Δυσκολία στην αναπνοή λόγω πρηξιμάτος στο λάρυγγα. Συριγμός δύσπνονοι και βήχας μπορεί να προκληθούν από τη σύνθετη των μυών στους πνευμόνες
- Άλλα συμπτώματα αναφυλαξίας σε συμπεριλαμβανομένων κεφαλαλγίας, έμετου και διάρροιας.
- Κατάρρευση και απώλεια συνείδησης εξαιτίας της αιφνίδιας μείωσης της αρτηριακής πίεσης.

Αν εμφανίσετε αυτά τα σημεία και συμπτώματα χρησιμοποιήστε αμέσως την αυτοχορηγούμενη ένεση Anapen. Πρέπει να ενέσετε αυτό το φάρμακο μόνο στο μυ στο εξωτερικό μέρος του μηρού, όχι στο γλουτό. Ορισμένες φορές μια εφαπάξ δόση αδρεναλίνης μπορεί να μην είναι επαρκής για να αντιστραφούν πλήρως οι επιδράσεις μιας σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης. Για το λόγο αυτού, ο γιατρός σας έχει πιθανόν να συνταγογραφήσει περισσότερα του ενός Anapen για σας. Εάν δεν βελτιωθούν τα συμπτώματά σας ή επιδεινωθούν εντός 5-15 λεπτών μετά την πρώτη ένεση, είτε εσείς ή το άτομο που είναι μαζί σας πρέπει να χορηγήσει μια δεύτερη ένεση. Για το λόγο αυτό πρέπει πάντοτε να έχετε μαζί σας περισσότερα του ενός Anapen μαζί σας.

Χρήση σε ενήλικες

- Η συνήθης δόση είναι 300 μικρογραμμάρια.
- Ενήλικες μεγαλύτερους βάρους μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από μια ενέσεις για να αναστρέψουν το αποτέλεσμα μιας αλλεργικής αντίδρασης.

Χρήση σε παιδιά και εφήβους


- Η κατάλληλη δόση μπορεί να είναι 150 μικρογραμμάρια ή 300 μικρογραμμάρια.
- Αυτό εξαρτάται από το βάρος σώματος του παιδιού και την κρίση του γιατρού.
- Μια συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης που χρηγεί 150 μικρογραμμάρια αδρεναλίνης είναι επίσης διαθέσιμη. Δοσολογία μικρότερη των 150 μικρογραμμαρίων δεν μπορεί να χορηγηθεί με επαρκή ακρίβεια σε παιδιά που ζυγίζουν λιγότερο από 15 kg και η χρήση της δεν συνιστάται παρά μόνο εάν υπάρχει κατάσταση απειλητική για τη ζωή και υπό την επιβλεψη γιατρού.

Οδηγίες χρήσης

Συνιστάται τα μελή της οικογένειας σας, οι υπεύθυνοι για τη φροντίδα σας ή οι δάσκαλοι να λάβουν επίσης οδηγίες για την ορθή χρήση του Anapen.

A. Εξαρτήματα της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapen:

Πριν από τη χρήση της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapen, πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τα εξαρτήματα της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης. Αυτά εμφανίζονται στην εικόνα.



• **Περιστρέφομενο κάλυμμα πάνω από τη θυρίδα διαλύματος:** Περιστρέψτε το κάλυμμα πάνω από τις θυρίδες του διαλύματος ώστε να ευθυγραμμιστούν οι φακοί με τις θυρίδες του διαλύματος στο σώμα της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης.

• **Θυρίδα διαλύματος:** Κοιτάξτε μέσα από το φακό σε αυτήν τη θυρίδα πριν από την ένεση για να ελέγχετε ότι το διάλυμα είναι διαυγές και έτοιμο για χρήση.

• **Δείκτης ένεσης:** Πριν από την ένεση, μπορείτε να δείτε ένα λευκό πλαστικό έμβολο διαμέσου της θυρίδας. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapen δεν έχει πυροδοτηθεί κατά λάθος ή δεν έχει παραβιαστεί. Μετά την ένεση, ο δείκτης ένεσης γίνεται κόκκινος. Αυτό υποδεικνύει τη σωστή πυροδότηση της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapen.

• **Μαύρο προστατευτικό κάλυμμα βελόνας (αναστρέψιμο):** Προστατεύει τη βελόνα όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapen. Απομακρύνετε το προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας πριν από την ένεση. Μετά από την ένεση, περιστρέψτε το μαύρο προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας και επαναφέρετε το στο ίδιο άκρο της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapen για να καλύψετε τη βελόνα.

• **Γκρι πώμα ασφαλείας:** Καλύπτει το κόκκινο κουμπί πυροδότησης. Εμποδίζει το ακούσιο πτήμα του κουμπίου.

Μην αφαιρείτε ούτε το μαύρο προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας ούτε το γκρι πώμα ασφαλείας έως ότου χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapen.

B. Ελέγξτε τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapen

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapen, πρέπει να την ελέγχετε ως εξής:

1. Περιστρέψτε το κάλυμμα πάνω από τις θυρίδες του διαλύματος, πλήρως αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού, όπως δείχνει το βέλος ώστε να ευθυγραμμιστούν οι φακοί με τις θυρίδες του διαλύματος στο σώμα της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης.
2. Κοιτάξτε μέσα από τους φακούς τη θυρίδα διαλύματος. Ελέγξτε ότι το διάλυμα είναι διαυγές και χρωματικό. Εάν είναι θολό, χρωματισμένο ή περιέχει σωματίδια, απορρίψτε τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapen.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης ένεσης δεν είναι κόκκινος. Εάν είναι κόκκινος, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapen έχει ήδη πυροδοτηθεί και πρέπει να την απορρίψετε.
4. Περιστρέψτε το κάλυμμα πάνω από τις θυρίδες του διαλύματος πλήρως προς τα πίσω σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, όπως δείχνει το βέλος για να βεβαιωθεί ότι είναι καλυμμένες και οι δύο θυρίδες διαλύματος. Τοποθετήστε τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapen στη χάρτινη συσκευασία έως ότου χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσετε.

G. Χρήση της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapen

Εάν το μαύρο προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας έχει αφαιρεθεί, **μην τοποθετείτε τον αντίτικη, τα δάκτυλα ή το χέρι σας πάνω από το ανοικτό άκρο (άκρο βελόνας) της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapen.**

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapen, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε το μαύρο προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας τραβώντας δυνατά προς την κατεύθυνση του βελούς. Ετοιμαστείτε για επίσης ένα γκρι προστατευτικό θηλάρι της βελόνας.
2. Αφαιρέστε το γκρι πώμα ασφαλείας από το κόκκινο κουμπί πυροδότησης, τραβώντας όπως υποδεικνύουν τα βέλη.
3. Κρατήστε το ανοικτό άκρο (άκρο βελόνας) της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapen πάνω στην εξωτερική πλευρά του μηρού. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapen πάνω στη ελαφρύ ρουσισμό, όπως ρούχα από τντένι, βαμβάκι ή πολυεστέρα.
4. Πλατήστε το κόκκινο κουμπί πυροδότησης έτσι ώστε να κάνει ένα κλικ. **Συνέχιστε να κρατήστε τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapen πάνω στην εξωτερική πλευρά του μηρού για 10 δευτερόλεπτα.** Αφαιρέστε αργά τη συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapen από το μηρό. Στη συνέχεια μαλάστε απαλά την περιοχή ένεσης.
5. Ο δείκτης ένεσης θα έχει γίνει κόκκινος. Αυτό σημαίνει ότι η ένεση ολοκληρώθηκε. Εάν ο δείκτης ένεσης δεν γίνει κόκκινος, η ένεση πρέπει να επαναληφθεί με καινούρια συσκευή αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapen.
6. Μετά την ένεση, η βελόνα εξέχει. Για να την καλύψετε, εφαρμόστε το φαρδύ άκρο του μαύρου προστατευτικού καλύμματος της βελόνας πάνω στο ανοικτό άκρο (άκρο βελόνας) της συσκευής αυτοχορηγούμενης ένεσης Anapen (όπως υποδεικνύει το βέλος).

To Anapen είναι σχεδιασμένο για θεραπεία διάσωμης. Θα πρέπει πάντα να αναζητάτε ιστική βοήθεια αμέσως μετά τη χρήση του Anapen. Καλέστε 166 και ζητήστε να απενοχθορίσετε «αναφυλαξία» ακόμη και αν τα συμπτώματα δείχνουν ότι βελτιώνονται. Στην Κύπρο καλέστε 199. Θα χρειαστεί να πάτε σε νοσοκομείο για παρακολούθηση και την επιπλέον θεραπεία που απαιτείται. Αυτό γίνεται διότι η αντίδραση μπορεί να ξανασυμβεί λίγο αργότερα.